



Wendelin essencia diarrhea

Állatgyógyászati gyógyhatású készítmény

reg.száma: 794/1-3 NÉBIH ÁTI

Termékforma: tömény oldat, essencia az állatok itatóvizébe

További információ: www.wendelin-essencia.hu

A készítmény gyógynövényei és komplex hatásjavítók:

- Rumex acetosa L. Mezei sóska (Rumicis fructus)
- Juglans regia L. Közönséges dió (Jugladis folium)
- Urtica dioica L. Nagy csalán (Urticae folium)
- Matricaria recutita L. Orvosi székfű (Chamomillae anthodium)
- Salvia officinalis L., Orvosi zsálya (Salviae folium)
- Vaccinium myrtillus L. Fekete áfonya (Myrtilli folium)
- Carum carvi L. Kömény (Carvi fructus)
- Pimpinella anisum L. Ánizs (Anisi fructus)
- Fulvosav (Fulvic acid)
- Almapektin (Pupillam pectin)
- Parajdi natur só (Natrii chloridum) fulvosav komplex

Állatfajok:

Szopós- és választott malac, növendék sertés, tenyészsertés, borjú, bárány, csirke, tojótyúk, pulyka és víziszárnyas

A készítmény felhasználása, javaslat, javallatok:

A termék egy koncentrált 10 féle gyógynövényt tartalmazó essencia.

Többféle élettani mechanizmuson keresztül kezeli a hasmenéseket. Az essencia kivédi a fakultative patogén kórokozók által okozott, a bél-diszbiózis következményeként jelentkező hasmenést, valamint az ozmotikus és a szekréciós hasmenést.

Baktericid és bakteriosztatikus gyógynövények vannak a termékben. Gyógynövény keveréke segíti a diszbiózist okozó gram- és gram+ bélbaktériumok kiszorítását a bélcsatornából, baktericid és bakteriosztatikus hatása van a diszbiotikus bélbaktériumokra. Nem akadályozzák az eubiotikus bélflóra értékes fajainak a szaporodását.

Több gyógynövény is van a termékben, amely gyomor nyálkahártya és bélnyálkahártya gyulladást akadályozó hatással bír.


Több adsztringens hatású, hasmenést csillapító, a gyulladt bélnyálkahártya felületén fehérje kicsapódást eredményező, bevonó hatású gyógynövény van benne, csökkenti a gyulladást, serkenti a bélnyálkahártya regenerációt.

Kétféle természetes komplex- és kelátképző is van a készítményben.

A pektin javítja a monoszacharidok hasznosulását, segíti az eubiotikus bélflóra fenntartását, segíti a bél immunállapotának stabilitását.

A fulvosav javítja a takarmányok táplálóanyagainak (szabad aminosavak, ásványi anyagok) felszívódását.

Az almapektin egy természetes prebiotikum, az eubiotikus bélflórát táplálja, adszorbens, gélt képez a bélcsatornában. Nyálkahártya bevonó hatással bír, amely kiszorítja a vastagbélből az úgynevezett dekarboxiláz enzimtermelő baktériumokat, ezáltal csökkenti az állatokot érő káros biogén amin hatást.



A hasmenéses állatok elektrolit veszteségét egy optimális összetételű természetes elektrolit pótlóval oldjuk meg, amely komplexkötésben hozva, a vékonybél elején 100%-ban felszívódik.

Adagolás és az alkalmazás módja:

A minimális beavatkozási idő 10 nap, ez alatt az idő alatt regenerálódik a bélnyálkahártya. A bélbolyhok (villus) epithelium enterocyta sejtjeinek a migrációja és regenerálódása 5-7 nap.

Ha a hasmenés ismételten megjelenik, akkor újra használhatjuk a készítményt minimum 10 napig.

A Wendelin essencia diarrhea tömény essencia.

A felhasználás során a következők szerint kell hígítani.

Fiaztatóban, 7 napnál idősebb szopós malacoknak:

1 rész Wendelin essencia diarrhea-t 1 rész ivóvízzel kell összekeverni, ezt a törzsoldatot kell a használatos kerek taposórácshoz fogatható malac önetetőbe önteni, ahonnan az ismerkedés után a malacok szívesen isszák. Vigyázat, távol a kocáktól, mert a koca is szereti és megissza a malacok elől! A hígítás mértékében kalkulálva van, hogy a szopós malacok tejszopás melletti ivóvíz felvétele kevesebb, mintha kizárólag száraz takarmányt ennének.

Malacutónevelőn 24-42 napos kor között:

A Wendelin essencia diarrhea-t kell a használatos gyógyszeradagolóval 2 %-ban az ivóvízhez keverni. Választással egy időben különösen javallott, a hasmenés megelőzése céljából.

Malacutónevelőn 43-80 napos kor között:

A Wendelin essencia diarrhea-t kell a használatos gyógyszeradagolóval 1 %-ban az ivóvízhez keverni.

Hízó sertéseknek 80 nap felett:

A Wendelin essencia diarrhea-t kell a használatos gyógyszeradagolóval 0,5 %-ban az ivóvízhez keverni.

Utónevelt borjaknak:

A tejpótlóval való táplálás után az itatása különösen javallott a hasmenés megelőzése céljából.

A Wendelin essencia diarrhea-t kell a használatos gyógyszeradagolóval 1 %-ban az ivóvízhez keverni.

Broiler csirkénél, pulykánál és vízi szárnyasoknál:

Indítótápnál: A Wendelin essencia diarrhea-t kell a használatos gyógyszeradagolóval 2 %-ban az ivóvízhez keverni.

Nevelőtápnál: A Wendelin essencia diarrhea-t kell a használatos gyógyszeradagolóval 1 %-ban az ivóvízhez keverni.

Csomagolás: 5, 10 és 20 literes ADR minősítésű, HDPE műanyag kannákban.

A gyártó neve, címe: Mester és Major Kft

5540 Szarvas, Vajda Péter u. 44.

Wendelin manufactura 5540 Szarvas, Tanya V. külkerület 203.

